

Histamine provocatie test

Te staken medicatie

Longgeneeskunde

Inleiding

U heeft een afspraak bij de polikliniek Longgeneeskunde voor een Histamine provocatie test. Deze folder geeft informatie over welke medicatie u moet stoppen en hoe lang van te voren die medicatie gestopt moet worden.

Let op!

Belangrijk is dat voor eventuele volgende afspraken uw medicatie **wel** door gebruikt moet worden. Medicatie alleen staken wanneer u dat expliciet verteld wordt of wanneer u deze lijst meekrijgt voor uw afspraak.

Medicatie die gestopt moet worden

In onderstaande tabellen staat welke medicatie gestopt moet worden. Aangegeven is het aantal uren voor het onderzoek dat **geen** medicatie gebruikt mag worden.

Minimaal 6 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Airomir, Ventolin, Salomol	Salbutamol

Minimaal 12 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Atrovent, Ipraxa	Ipratropium (bromide)
Berodual	Fenoterol / Ipratropium
Bricanyl	Terbutaline
Combivent, Combipramol, Ipramol	Ipratropium / Salbutamol

Minimaal 36 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Atimos, Foradil, Oxis	Formoterol
Busalair	Budesonide / Salmeterol
Eklira Genuair, Bretaris Genuair	Acidinium
Flutiform	Fluticason / Formoterol
Foster	Beclometason / Formoterol
Serevent	Salmeterol
Seretide, AirFlusal Forspiro, Elpenhaler, Salflutin, Salfuler	Fluticason / Salmeterol
Symbicort, Bufoler, DuoResp Spiromax	Budesonide / Formoterol
Duaklir Genuair	Acidinium / Formoterol
Singulair	Montelukast

Minimaal 48 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Atechure	Indacaterol / Mometason
Daxas	Roflumilast
Onbrez, Hirobriz	Indacaterol
Relvar	Fluticasonfuroaat / Vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair (retard), Theolin, Unilair	Theofylline

Minimaal 168 uur (= minimaal 1 week)	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Anoro	Umeclidinium / Vilanterol
Bevespi	Glycopyrronium / Formoterol
Energair	Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason
Incruse	Umeclidinium
Seebri, Tovonor	Glycopyrronium
Spiriva, Tiotrus	Tiotropium (bromide)
Trelegy Ellipta	Fluticason / Umeclidinium / Vilanterol
Trimbaw	Beclametason / Formoterol / Glycopyrronium
Ultibro, Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium / Olodaterol

Antihistamine (anti-allergie medicijnen) die NIET ingenomen mag worden

In onderstaande tabel staat welke medicatie niet gebruikt mag worden, tenzij de arts anders beslist.

Minimaal 3 dagen voor de test	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Aerius, Neoclarityn	Desloratadine
Allerfre, Claritine	Loratadine
Atarax, Hydroxyzine	Hydroxyzine
Cinnipirine, Cinnarizine, Primatour	Cinnarizine
Marzine, Cyclizine, Primatour	Cyclizine
Dramamine	Dimenhydrinaat
Emesafene	Meclozine/Pyridoxine
Incidal, Mebhydroline	Mebhydroline
Fenistil	Dimetindeen
Kestine	Ebastine
Ketotifen, Zaditen	Ketotifen
Mizollen	Mizolastine
Nedeltran	Alimemazine
Periactin	Cyproheptadine
Promethazine	Promethazine
Phenergan, Promethazine	Promethazine
Polaramine	Dexchlorfeniramine
Reactine, Zyrtec, Revalintabs	Cetirizine
Rupafin	Rupatadine
Semprex	Acrivastine
Tavegyl	Clemastine
Telfast	Fexofenadine
Tinset	Oxatomide
Triludan, Triludan Forte	Terfenadine
Xyzal	Levocetirizine
Zaditen	Ketotifen
Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine	Cetirizine

Long- / neusmedicatie die wel ingenomen mag worden

In onderstaande tabel staat welke medicatie wel gebruikt mag worden, tenzij de arts anders beslist.

Longmedicatie	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Alvesco	Ciclesonide
Flixotide	Fluticason (propionaat)
Lomudal	Cromoglicinezuur
Pulmicort	Budesonide
Tilade	Nedocromil
Qvar	Beclometason (dipropionaat)
	Prednisolon

Neussprays	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Allergocrom COMOD, Cromoglycaat, Prevalin	Cromoglicinezuur
Avamys, Flixonase	Fluticason (propionaat)
Dymista	Azelastine / fluticason
Nasonex	Mometason
Rhinocort	Budesonide

Aandachtspunten / opmerkingen

Komt de door u gebruikte long-, neus- of anti-allergie medicatie niet op deze lijst voor, overleg dan met de (long)arts over het wel / niet staken van deze medicatie.

Na de Histamine provocatie test

U mag na het onderzoek uw eigen medicatie weer gebruiken. tenzij anders is afgesproken met de behandelend (long)arts.

Aanvullende informatie

Meer informatie over longfunctieonderzoeken vindt u:

- in de folder Longfunctieonderzoek;
- op de website van MST onder het specialisme Longgeneeskunde bij informatie over onderzoeken: <https://www.mst.nl/p/specialismen/longgeneeskunde/onderzoeken/>

Belangrijke contactgegevens

- Polikliniek Longgeneeskunde, route B23, telefoon (053) 487 26 10.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts, verpleegkundige of longfunctie analist dan om nadere uitleg.