

Het stoppen van (long)medicijnen bij een Histamine provocatie test

Longgeneeskunde / Longfunctie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de polikliniek Longgeneeskunde voor een Histamine provocatie test. Deze folder geeft informatie over welke medicijnen/pufjes u moet stoppen en hoe lang van te voren die medicijnen/pufjes gestopt moet worden.

Let op!

Belangrijk is dat voor eventuele volgende afspraken uw medicijnen/pufjes **wel** door gebruikt moeten worden. Medicijnen/pufjes alleen stoppen wanneer u dat uitdrukkelijk verteld wordt of wanneer u deze lijst meekrijgt voor uw afspraak.

Medicijnen/pufjes die gestopt moet worden voor het onderzoek

In onderstaande tabellen staat welke medicijnen/pufjes gestopt moeten worden. Aangegeven is **het aantal uren/dagen voor het onderzoek** dat **geen** medicijnen/pufjes gebruikt mogen worden.

Minimaal 6 uur stoppen

Airomir
Berotec
Pulmadil
Rimiterol
Salbutamol
Salomol
Ventolin

Minimaal 12 uur stoppen

Atrovent,
Berodual
Bricanyl
Combivent
Combipramol
Combiprasal
Eklira
Fenoterol / Ipratropium
Ipramol
Ipratropium (bromide)
Ipratropium / Salbutamol
Ipraxa
Salbutamol/ Ipratropium
Terbutaline

Minimaal 36 uur stoppen (1.5 dag)

Aclidinium
Aclidinium / Formoterol
AirBuFo Forspiro
AirFlusal Forspiro
Atimos
Beclometason / Formoterol
Bretaris Genuair
Budesonide / Formoterol
Budesonide / Salmeterol
Bufoler
Busalair
Duaklir Genuair
DuoResp Spiromax
Eklira Genuair
Elpenhaler
Fluticason / Formoterol
Fluticason / Salmeterol
Flutiform
Foradil
Formoterol
Foster
Montelukast
Oxis
Salfuler
Salfutin
Salmeterol
Seretide
Serevent
Singulair
Symbicort

Minimaal 48 uur (2 dagen)	
Atechure	Relvar
Daxas	Roflumilast
Fluticasonfuroaat / Vilanterol	Striverdi
Hirobriz	Theofylline
Indacaterol	Theolair (retard)
Indacaterol / Mometason	Theolin
Olodaterol	Unilair
Onbrez	

Minimaal 168 uur (= minimaal 1 week)	
Anoro	Tiotropium (bromide)
Beclameton / Formoterol / Glycopyrronium	Tiotropium / Olodaterol
Bevespi	Tiotrus
Energair	Tovanor
Fluticason / Umeclidinium / Vilanterol	Tiotropium (bromide)
Glycopyrronium	Tiotropium / Olodaterol
Glycopyrronium / Formoterol	Trelegy Ellipta
Incruse	Trimbow
Indacaterol / Glycopyrronium	Ultibro
Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason	Umeclidinium
Seebri	Umeclidinium / Vilanterol
Spiolto	Xoterna
Spiriva	

Antihistamine (anti-allergie) medicijnen/tabletten die u **NIET** mag innemen.

In onderstaande tabel staat welke medicijnen **NIET** gebruikt mag worden, tenzij de arts anders beslist.

Minimaal 3 dagen voor de test <u>NIET</u> meer innemen	
Aerius	Loratadine
Acrivastine	Meclozine/Pyridoxine
Alimemazine	Mizolastine
Allerfre	Mizollen
Anti allergie medicijn	Nedeltran
Cetirizine	Neoclarityn
Cinnarizine	Phenergan
Claritine	Polaramine
Clemastine	Prevalin Allerstop
Desloratadine	Primatour
Dexchlorfeniramine	Promethazine
Dimenhydrinaat	Reactine
Dimetindeen	Rupafin
Dramanine	Rupatadine
Ebastine	Semprex
Zie volgende pagina voor meer anti-allergie medicijnen/tabletten	

Emesafene	Tavegyl
Fenistil	Telfast
Hydroxyzine	Xyzal
Kestine	Zaditen
Ketotifen	Zyrtec
Levocetirizine	

Long-medicijnen/pufjes die wel ingenomen mogen worden

In onderstaande tabel staat welke medicijnen/pufjes wel gebruikt mogen worden, tenzij uw arts anders beslist.

Longmedicijnen (pufjes) die u <u>NIET</u> hoeft te stoppen	
Alvesco	Fluticason
Beclometason	Prednisolon
Budesonide	Pulmicort
Ciclesonide	Qvar
Cromoglicinezuur	Soprobeq
Flixotide	Tilade

Neusspray die wel gebruikt mag worden

In onderstaande tabel staat welke neusspray wel gebruikt mag worden, tenzij uw arts anders beslist.

Neusspray die u <u>NIET</u> hoeft te stoppen	
Allergo-COMOD	Flixonase
Allergodil Nevel	Fluticasonfuroaat
Avamys	Levocabastine
Azelastine / fluticason	Livocab
Azelergo	Mometason
Beclometason	Nasonex
Budesonide	Natriumchloride
Carelastin	Pollival
Cromoglicinezuur	Pollispray
Cromoglycaat	Prevalin
Dymista	

Aandachtspunten / opmerkingen

Komen de door u gebruikte long-, neus- of anti-allergie medicijnen/pufjes niet op deze lijst voor, overleg dan met de (long)arts over het wel/niet staken van deze medicijnen.

Na de Histamine provocatie test

U mag na het onderzoek uw eigen medicijnen/pufjes weer gebruiken tenzij anders is afgesproken met de behandelend (long)arts.



Aanvullende informatie

Meer informatie over longfunctieonderzoeken vindt u:

- in de folder Longfunctieonderzoek;
- op de website van MST onder het specialisme Longgeneeskunde bij informatie over onderzoeken:
<https://www.mst.nl/p/specialismen/longgeneeskunde/onderzoeken/>

Belangrijke contactgegevens

- Polikliniek Longgeneeskunde, route B23, telefoon (053) 487 26 10.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u alles hebt begrepen, kunt u toestemming geven voor een behandeling of een onderzoek. Als iets niet helemaal duidelijk is, vraag dan de behandelend arts, verpleegkundige of longfunctie analist om meer uitleg.