

Fulvestrant (Faslodex®)

Hoe werkt fulvestrant.

Fulvestrant is een anti-oestrogeen. Dat wil zeggen dat het de werking van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen tegengaat. Artsen schrijven het voor bij een hormoongevoelig borstkanker. Het is een injectie, 2 spuitjes in de bilspeer.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

- Pijn of ontsteking op de plaats van injectie. Zeer zelden bloedingstoring of bloeding op de plaats van injectie.
- Opvliegers, warm gevoel
- Zwak gevoel
- Maagklachten, zoals misselijkheid. Zelden braken, diarree en minder eetlust.
- Spierpijn en gewrichtspijn.
- Huiduitslag
- Verminderde leverwerking, zelden geelzucht of leverontsteking (hepatitis). Raadpleeg uw arts als u last krijgt van pijn in de bovenbuik, gele kleur van de ogen, verkleurde ontlasting of zeer donkere plas.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag of galbulten.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

- Hoofdpijn
- Ontsteking van de blaas of plasbuis
- Rugpijn
- Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dit gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed.
- Bloeding of afscheiding uit de vagina, ontsteking of jeuk van de vagina.
- Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruikt u fulvestrant

Hoe?

U krijgt dit medicijn via 2 injecties, 1 in elke bil. De huisarts dient de injecties toe.

Wanneer?

U krijgt de injecties eenmaal per maand toegediend.

Na de eerste injecties krijgt u eenmaal een extra dosering tussendoor, namelijk 2 weken na de eerste injecties.

Hoelang?

zolang het middel werkzaam is.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts/verpleegkundig specialist in geval van:

- Koorts
- Koude rillingen
- Kortademigheid
- Bloedingen
- Veel blauwe plekken

CONTACT

Tijdens kantoortijden (8:30-16.30u)

Verpleegkundig specialisten: Brigitte Heck en Elvera Meussen.

Interne geneeskunde, unit hematologie/oncologie

Telefoon: **053-4872440**

Buiten kantoortijden, alléén bij spoedvragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag

Medisch Spectrum Twente: **053-4872000**

Vragen naar de dienstdoende internist