



## Cyste drainage bij echo-endoscopie Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum

### Wat is een cyste drainage?

Een cyste is een abnormale holte in het lichaam. Zo'n holte is van binnen bedekt met een vlies en kan gevuld zijn met gas, vocht of half weg te halen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een flexibele slang (endoscoop) met aan het uiteinde een klein echo-apparaatje. Dit apparaatje zend geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven worden op een monitor omgezet in beeld zodat wij de cyste goed kunnen bekijken. Ook wordt er gebruik gemaakt van röntgenstraling.

### Sedatie formulier

Omdat dit onderzoek altijd met verdoving wordt gedaan, krijgt u extra informatie mee over de verdoving. Heeft u deze informatie niet gekregen neem dan contact op met het Endoscopiecentrum.

### Vorbereiding thuis

- uw slokdarm en maag moeten leeg zijn. Is het onderzoek in de ochtend? Dan mag u vanaf **24.00 uur** niets meer eten en drinken. Roken wordt afgeraden. U mag uw ochtendmedicijnen **niet innemen**, tenzij iets anders met u is afgesproken;
- Is het onderzoek in de middag? Dan mag u 's morgens een **licht ontbijt** (een kop thee met een beschuit) eten. Dit tot **6 uur** voor het onderzoek. Uw medicijnen kunt u 's morgens gewoon innemen, tenzij anders met u is afgesproken;
- u wordt opgenomen na het onderzoek, tenzij u al opgenomen bent;
- draag tijdens het onderzoek gemakkelijk zittende kleding;
- neem uw identiteitsbewijs mee;
- meldt u zich 15 minuten voor het afgesproken tijdstip bij polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

### Bloedverduunners

Gebruikt u medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, dan kan het zijn dat de dosering moet worden aangepast voor het onderzoek. Als de dosering Sintrommitis® (acenocoumarol) of Marcoumar® (fenprocoumon) moet worden aangepast, geven wij dit door aan de trombosedienst. Op de dag voor het onderzoek wordt uw bloed gecontroleerd in MST of bij Ascon.

### Diabetespatiënten

Heeft u diabetes (suikerziekte) dan krijgt u extra informatie mee. Als u deze extra informatie niet heeft gekregen, neem dan contact op met ons Endoscopiecentrum. Wij sturen u dan alsnog deze belangrijke aanvullende informatie toe. Heeft u nog een afspraak bij de screeningsverpleegkundige, dan geeft zij u de instructies en hoeft u niet te bellen.

### Het onderzoek

Nadat u zich gemeld heeft bij de balie Maag-, Darm- en Leverziekten, kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Omdat er bij ons verschillende onderzoeken plaatsvinden, kan het lijken dat een ander voorgaat. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de behandelkamer.

Daarna doen wij het volgende:

- er wordt een vragenlijst met u doorgenomen;
- als u veel last heeft van kokhalzen, kan uw keel in overleg met de endoscopist met een spray verdoofd worden om kokhalzen tegen te gaan;
- de arts brengt de echo-endoscoop door de bijtring op uw tong en vraagt u om te slikken. Daardoor opent de slokdarm en kan de arts de slang in de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm schuiven. Tijdens het onderzoek wordt door de echo-endoscoop wat lucht ingeblazen waardoor slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wijder open gaan. Waarschijnlijk moet u hiervan wat opboeren. De luchtwegen blijven vrij tijdens het onderzoek, u kunt gewoon adem halen;
- in de endoscoop bevindt zich in open kanaal. Via dit kanaal wordt er met een speciaal instrument toegang tot de cyste gemaakt. U kunt dit voelen, maar het doet geen pijn.
- afhankelijk van het soort cyste en weefsel kan het noodzakelijk zijn een spoel katheter (buisje) achter te laten in de cyste. Dit buisje gaat via uw neus;
- Voorafgaand aan het onderzoek kan er afgesproken worden dat u geïntubeerd wordt tijdens het onderzoek. Intubatie is het aanbrengen van een buisje in de luchtpijp om de luchtweg vrij te maken;
- bij het onderzoek kan geen familie of begeleiding aanwezig zijn, zij kunnen in de wachtkamer wachten;
- het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek kunt u een rauw gevoel hebben in uw keel, zeker als u tijdens het onderzoek een aantal keren flink moet kokhalzen. Als u nog niet bent opgenomen, wordt u op een afdeling opgenomen ter observatie en mag u vier uur na het onderzoek niet eten of drinken.

### **Uitslag**

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  
De onderzoeksresultaten zijn na vijf tot tien werkdagen bekend.

### **(Pijn)klachten**

Neemt na thuiskomst de buikpijn toe of krijgt u koorts, dan kunt u contact opnemen met:

- Endoscopiecentrum, telefoon (053) 4 87 33 18 (tijdens kantooruren);
- dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde, bereikbaar via het centrale nummer van ons ziekenhuis, telefoon (053) 4 87 20 00 (buiten kantooruren).

### **Mogelijke complicaties**

De meest voorkomende complicaties zijn:

- een luchtweginfectie of een longontsteking.
- een scheurtje in de slokdarm (of uiterst zelden in de maag)
- een bloeding doordat een bloedvat geraakt wordt;
- uitzakken van eventuele stents die in de cyste opening geplaatst zijn;
- een infectie.

### **Bent u verhinderd?**

Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de secretaresse van het Endoscopiecentrum, telefoon (053) 4 87 33 18 (tijdens kantooruren).

### **Belangrijke contactgegevens**

- Maag-, Darm- en Leverziekten, Endoscopiecentrum, route D25, telefoon (053) 4 87 33 18.

### **Tenslotte**

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.