

Sedatie tijdens behandeling en/of onderzoek

Longgeneeskunde

Geachte heer / mevrouw,

U heeft vandaag een behandeling / onderzoek ondergaan. U heeft daarbij intraveneus (in de ader) slaapmedicatie (Midazolam of Propofol) en eventueel een krachtige pijnstiller (Alfentanyl) toegediend gekregen. Hieronder vindt u verdere informatie over nazorg en richtlijnen.

Nazorg en richtlijnen

Houdt u rekening met het volgende:

- heeft u Midazolam gekregen, dan is het mogelijk dat u zich achteraf niet goed herinnert wat er tijdens of na het onderzoek met u besproken is;
- u mag tot 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Dit houdt in niet reizen per auto, fiets, openbaar vervoer of lopend zonder begeleiding;
- u wordt geadviseerd de dag van het onderzoek geen belangrijke beslissingen te nemen;
- u wordt geadviseerd de dag van het onderzoek geen alcohol te gebruiken;
- **u moet nuchter blijven tot uur.**

Contact

Krijgt u lichamelijke klachten van toenemende pijn, bloedverlies, koorts hoger dan 38 graden of u vertrouwt het gewoon niet, dan kunt u contact met ons opnemen:

- tijdens kantooruren: Polikliniek Longgeneeskunde, telefoon (053) 487 26 10;
- buiten kantooruren: dienstdoende arts-assistent Longgeneeskunde, bereikbaar via het centrale nummer van ons ziekenhuis, telefoon (053) 487 20 00.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team behandelkamer Longgeneeskunde en de Sedatie Praktijk Specialisten