

Azathioprine

Maag-, Darm- en Leverziekten

Inleiding

Uw specialist heeft u azathioprine voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek. Deze folder geeft algemene informatie over azathioprine.

Wat is azathioprine?

Azathioprine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 50 mg. Het is een medicijn dat werkt op uw immuunsysteem.

Heeft azathioprine een gunstig effect, dan kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Het is daarbij belangrijk dat u het middel blijft innemen, in de door de arts voorgeschreven hoeveelheid, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert. Als u het gebruik van dit medicijn staakt of het vaak vergeet in te nemen, dan heeft u onvoldoende behandeling waardoor u klachten kan krijgen van uw aandoening.

Uw specialist kan u voor het instellen op azathioprine verwijzen naar een verpleegkundig specialist of IBD-verpleegkundige. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease; vrij vertaald: ontstekingsziekte in de darm en/of het spijsverteringskanaal.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

U kunt azathioprine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Er zijn echter enkele geneesmiddelen waarvan de werking door azathioprine beïnvloed wordt.

Vertel uw huisarts of specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Wijze van innemen

Neem de tabletten steeds op dezelfde wijze in, met voedsel of op een lege maag, elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip. De tabletten kunnen met voedsel en water worden ingenomen. Voedsel verlicht mogelijk de misselijkheid.

Neem de tabletten ten minste 1 uur vóór of 2 uur na melk- of zuivelproducten in.

Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.

Als u in de loop van de dag ontdekt dat u de tabletten vergeten heeft in te nemen, neem deze dan nog dezelfde dag in. Bij misselijkheid mag de dosering van azathioprine verdeeld over de dag of voor het slapen gaan ingenomen worden.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van azathioprine die ooit zijn voorgekomen. De meest voorkomende zijn:

- misselijkheid, braken, algehele malaise, gewrichtsklachten en huiduitslag;
- hevige pijn in de buik, uitstralend naar rug, koorts;
- kortademigheidsklachten;
- risico op huidafwijkingen bij langdurig gebruik.

Heeft u veel last van bijwerkingen, neem laagdrempelig contact op met uw specialist of de verpleegkundig specialist / IBD verpleegkundige.

Neem direct contact op

Neem direct contact op met uw specialist of huisarts als u:

- kortademig wordt of veel hoest;
- erge keelpijn krijgt in combinatie met koorts;
- herhaaldelijk een bloedneus krijgt;
- snel blauwe plekken krijgt;
- koorts bij temperatuur 38,5 graden Celsius of hoger.

U kunt een specialist tijdens kantooruren bereiken via het secretariaat Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL), telefoon (053) 487 24 10. Buiten kantooruren belt u met de centrale receptie van ons ziekenhuis, telefoon (053) 487 20 00.

Controles

Om eventuele stoornissen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist regelmatig uw bloed onderzoeken. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis wel of niet aangepast. Ook daarna wordt minimaal één keer per jaar uw bloed gecontroleerd. De bloedcontroles vinden plaats voorafgaand aan uw poliklinische bezoek bij of telefonische afspraak met de specialist of verpleegkundig specialist / IBD-verpleegkundige. Zij kunnen u over de uitslagen informeren.

Inzichten met betrekking tot vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover tot op heden bekend is, heeft azathioprine waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg belangrijk om uw specialist te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Overleg de situatie met uw specialist en/of gynaecoloog.

Aanvullende informatie

Graag attenderen wij u op de volgende zaken:

- advies niet te lang in de zon, omdat dit het risico op huidmaligniteiten (huidkanker) vergroot, insmeren met hoog beschermingsfactor. Bij zonnebank eerste keer voorzichtig, mogelijk kans op huiduitslag;
 - bewaar uw medicijnen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen;
 - overmatig alcoholgebruik vermijden;
 - houdt u tabletten over, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.
- Kijk voor verdere en aanvullende informatie over het aanbod en bereikbaarheid van ons specialisme op onze website: www.mst.nl

Belangrijke contactgegevens

- polikliniek MDL, route D25, telefoon (053) 487 24 10.
- centrale receptie Medisch Spectrum Twente, route C02, telefoon (053) 487 20 00.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend specialist of verpleegkundig specialist / IBD-verpleegkundige dan om nadere uitleg. U kunt hiervoor het best een (telefonische) afspraak maken bij het secretariaat van de polikliniek MDL.