

Richtlijnen bij koorts Dabrafenib

Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), rillen, zweten of griepachtige klachten komen bij dabrafenib vaak voor en zijn meestal tijdelijke bijwerkingen. **Meet de temperatuur als u één van deze klachten heeft.**

Verder:

1. Neem GEEN dabrafenib en trametinib capsules.
2. Herstart dabrafenib en trametinib als u zich verder niet zieker voelt en 24 uur geen klachten meer heeft.
3. Om de temperatuur te verlagen:
 - Gebruik 4x per dag 1000 mg paracetamol (of ibuprofen)
 - Neem een lauw bad of spons u met lauw water af om de temperatuur proberen naar beneden te krijgen
 - Draag luchtige kleren en gebruik een lichte deken of laken
 - Drink veel vocht.

Neem direct contact op met uw behandelend arts, de verpleegkundig specialist of de dienstdoend internist-oncoloog als u last hebt van tenminste één van onderstaande punten:

- Een temperatuur van 40°C of hoger
- Koude rilling, zich erg zwak voelt of duizelig bent
- Een stijve nek hebt of moeite hebt om wakker te blijven
- Last van hevige maagpijn, meerdere keren overgeven of ernstige diarree
- Erge keelpijn hebt
- Kortademig bent, moet hoesten of pijn op de borst hebt
- Koorts die niet na 24 uur reageert op paracetamol of ibuprofen
- Koorts die terugkomt.

Er moet dan onderzocht worden of u bijvoorbeeld een infectie heeft.

Telefoonnummers

Tijdens kantooruren: secretariaat oncologie / hematologie 053-4872440.

Verpleegkundig specialist: Brigitte Heck / Elvera Meussen

Buiten kantooruren: 053-4872000 en vragen dienstdoend internist.