

# Het stoppen van longmedicijnen bij een longfunctie test

## Longgeneeskunde/ Longfunctie

### Inleiding

U heeft een afspraak bij de polikliniek Longgeneeskunde voor een longfunctieonderzoek. Bij deze test wordt gekeken of u reageert op een luchtwegverwijder. Deze folder geeft informatie over welke medicijnen/pufjes u moet stoppen en hoe lang van te voren die medicijnen/ pufjes gestopt moet worden.

### Let op!

Belangrijk is dat voor eventuele volgende afspraken uw medicijnen/pufjes **wel** door gebruikt moet worden. Medicijnen alleen staken wanneer u dat uitdrukkelijk verteld wordt of wanneer u deze lijst meekrijgt voor uw afspraak.

### Medicijnen die gestopt moet worden voor het onderzoek

In onderstaande tabellen staat welke medicijnen gestopt moet worden. Aangegeven is het **aantal uren voor het onderzoek** dat geen medicijnen/pufjes gebruikt mogen worden.

Minimaal 6 uur stoppen
Airomir
Berotec
Pulmadil
Rimiterol
Salbutamol
Ventolin
Salomol

Minimaal 12 uur stoppen
Aclidinium
Atrovent
Berodual
Bricanyl
Combivent
Combipramol
Combiprasal
Eklira
Fenoterol
Fenoterol/ Ipratropium
Ipramol
Ipratropium (bromide)
Ipratropium/ Salbutamol
Ipraxa
Salbutamol/ Ipratropium
Terbutaline

Minimaal 36 uur stoppen
AirBuFo
AirFlusal Forspiro
Aclidinium
Aclidinium/ Formoterol
Atimos
Beclometason/ Formoterol
Bretaris Genuair
Budesonide/ Formoterol
Budesonide/ Salmeterol
Bufoleer
Busalair
Duaklir Genuair
DuoResp Spiromax
Eklira Genuair
Elpenhaler
Fluticason/ Formoterol
Fluticason/ Salmeterol
Flutiform
Foradil
Formoterol
Foster
Montelukast
Oxis
Salflutin
Salfuler
Salmeterol
Seretide
Serevent
Singulair
Symbicort

Minimaal 48 uur	
Anoro	Spiriva
Atetcure	Striverdi
Beclometason/ Formoterol/ Glycopyrronium	Tavulus
Bevespi	Theofylline
Enerzair	Theolair (retard)
Fluticason/ Vilanterol/ Umeclidinium	Theolin
Glycopyrronium	Tiotropium (bromide)
Glycopyrronium/ Formoterol	Tiotropium/ Olodaterol
Hirobriz	Tiotrus
Incruse	Tovanor
Indacaterol	Trelegy Ellipta
Indacaterol/ Glycopyrronium	Trimbow
Indacaterol/ Mometason	Trixeo
Indacaterol/ Mometason/ Glycopyrronium	Ultibro
Olodaterol	Umeclidinium
Onbrez	Umeclidinium/ Vilanterol
Relvar	Unilair
Seebri	Vilanterol
Spiolto	Xoterna

## Long- / neusmedicijnen die u wel mag nemen.

In de onderstaande tabel staat welke medicijnen/pufjes u **wel** mag gebruiken, tenzij de arts anders beslist.

Longmedicijnen die u <u>niet</u> hoeft te stoppen	Neussprays die u <u>niet</u> hoeft te stoppen
Alvesco	Allergocrom COMOD
Beclometason (dipropionaat)	Avamys
Budesonide	Azelastine/ fluticason
Ciclesonide	Budesonide
Cromoglicinezuur	Cromoglicinezuur
Fluticason (propionaat)	Cromoglycaat
Flixotide	Dymista
Lomudal	Flixonase
Nedocromil	Fluticason (propionaat)
Prednisolon	Mometason
Pulmicort	Nasonex
Soprobex	Prevalin
Tilade	Rhinocort
Qvar	

## Antihistamine (anti-allergie medicijnen/tabletten) die u wel mag innemen.

In de onderstaande tabel staat welke medicijnen/tabletten u **wel** mag gebruiken, tenzij de arts anders beslist.

Doorgebruiken	Doorgebruiken
Acrivastine	Loratadine
Aerius	Mizolastine
Alimemazine	Mizollen
Allerfre	Nedeltran
Anti allergie medicijn	Neoclarityn
Cetirizine	Phenergan
Cinnarizine	Polaramine
Claritine	Prevalin Allerstop
Clemastine	Promethazine
Desloratadine	Reactine
Dexchlorfeniramine	Rupafin
Dimetindeen	Rupatadine
Ebastine	Semprex
Fenistil	Tavegyl
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Xyzal
Ketotifen	Zaditen
Kestine	Zyrtec
Levocetirizine	

### Aandachtspunten / opmerkingen

Komen de door u gebruikte long-, neus- of anti-allergie medicijnen/pufjes niet op deze lijst voor, overleg dan met uw (long)arts over het wel / niet staken van deze medicijnen.

### Na het longfunctieonderzoek

U mag na het onderzoek uw eigen medicijnen/pufjes weer gebruiken, tenzij anders is afgesproken met uw (long)arts.

### Aanvullende informatie

Meer informatie over longfunctieonderzoeken vindt u:

- in de folder Longfunctieonderzoek;
- op de website van MST onder het specialisme Longgeneeskunde bij informatie over onderzoeken: <https://www.mst.nl/p/specialismen/longgeneeskunde/onderzoeken/>

### Belangrijke contactgegevens

- Polikliniek Longgeneeskunde, route B23, telefoon (053) 487 26 10.

### Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet helemaal duidelijk is, vraagt u de behandelend arts, verpleegkundige of longfunctie analist dan om nadere uitleg.