

Het stoppen van (long)medicijnen bij een Methacholine provocatie test

Longgeneeskunde/Longfunctie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de polikliniek Longgeneeskunde voor een Methacholine provocatie test. Deze folder geeft informatie over welke medicijnen/pufjes u moet stoppen en hoe lang van te voren.

Let op!

Belangrijk is dat voor eventuele volgende afspraken uw medicijnen/pufjes **wel** door gebruikt moeten worden. Medicijnen/pufjes alleen stoppen wanneer u dat uitdrukkelijk verteld wordt of wanneer u deze lijst meekrijgt voor uw afspraak.

Medicijnen die gestopt moeten worden voor het onderzoek

In onderstaande tabellen staat welke medicijnen/pufjes gestopt moet worden. Aangegeven is het **aantal uren/dagen voor het onderzoek** dat **geen** medicijnen/pufjes gebruikt mag worden.

Minimaal 6 uur stoppen	Minimaal 12 uur stoppen
Airomir	Atrovent
Berotec	Berodual
Pulmadil	Bricanyl
Rimiterol	Combivent
Salbutamol	Combipramol
Salomol	Combiprasal
Ventolin	Eklira
	Fenoterol / Ipratropium
	Ipramol
	Ipratropium (bromide)
	Ipratropium / Salbutamol
	Ipraxa
	Salbutamol/ Ipratropium
	Terbutaline

Minimaal 36 uur stoppen (1.5 dag)	
AirFlusal Forspiro	Flutiform
Atimos	Foradil
Beclometason / Formoterol	Formoterol
Bretaris Genuair	Foster
Budesonide / Formoterol	Montelukast
Budesonide / Salmeterol	Oxis
Bufoleer	Salfuler
Busalair	Salfutin
Duaklir Genuair	Salmeterol
DuoResp Spiromax	Seretide
Eklira Genuair	Serevent
Elpenhaler	Singular
Fluticason / Formoterol	Symbicort
Fluticason / Salmeterol	

Minimaal 48 uur stoppen (2 dagen)	
Atechure	Roflumilast
Daxas	Striverdi
Fluticasonfuroaat / Vilanterol	Theofylline
Hirobriz	Theolair (retard)
Indacaterol	Theolin
Indacaterol / Mometason	Unilair
Olodaterol	Roflumilast
Onbrez	Striverdi
Relvar	

Minimaal 168 uur stoppen (1 week)	
Anoro	Spiriva
Beclametason / Formoterol / Glycopyrronium	Tiotrus
Bevespi	Tiotropium (bromide)
Enerzair	Tiotropium / Olodaterol
Fluticason / Umeclidinium / Vilanterol	Tovanor
Glycopyrronium	Trelegy Ellipta
Glycopyrronium / Formoterol	Trimbow
Incruse	Ultibro
Indacaterol / Glycopyrronium	Umeclidinium
Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason	Umeclidinium / Vilanterol
Seebri	Xoterna
Spiolto	

Long-medicijnen die wel ingenomen mogen worden

In de onderstaande tabel staat welke medicijnen/pufjes u wel mag gebruiken, tenzij de arts anders beslist.

Longmedicijnen (pufjes) die u <u>NIET</u> hoeft te stoppen	
Alvesco	Fluticason (propionaat)
Beclometason (dipropionaat)	Prednisolon
Budesonide	Pulmicort
Ciclesonide	Qvar
Cromoglicinezuur	Soprobeq
Flixotide	Tilade

Neusspray die wel gebruikt mag worden

In onderstaande tabel staat welke neusspray wel gebruikt mag worden, tenzij uw arts anders beslist.

Neusspray die u <u>NIET</u> hoeft te stoppen	
Allergocrom COMOD	Cromoglycaat,
Allergodil Nevel	Dymista
Avamys	Flixonase
Azelastine / fluticason	Fluticason (propionaat)
Azelergo	Mometason
Beclometason	Nasonex
Budesonide	Prevalin
Cromoglicinezuur	Rhinocort

Antihistamine (anti-allergie) medicijnen die u wel mag innemen.

In onderstaande tabel staat welke medicijnen u **wel** mag gebruiken, tenzij de arts anders beslist.

Doorgebruiken	Doorgebruiken
Acrivastine	Levocetirizine
Aerius	Loratadine
Alimemazine	Meclozine/Pyridoxine
Allerfre	Mizolastine
Anti allergie medicijn	Mizollen
Cetirizine	Nedeltran
Cinnarizine	Neoclarityn
Claritine	Phenergan
Clemastine	Polaramine
Desloratadine	Prevalin Allerstop
Dexchlorfeniramine	Primatour
Dimenhydrinaat	Promethazine
Dimetindeen	Reactine
Dramanine	Rupafin
Ebastine	Rupatadine
Emesafene	Semprex
Fenistil	Tavegyl
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Xyzal
Kestine	Zaditen
Ketotifen	Zyrtec

Aandachtspunten / opmerkingen

Komen de door u gebruikte long-, neus- of anti-allergie medicijnen/pufjes niet op deze lijst voor, overleg dan met uw (long)arts over het wel of niet stoppen van deze medicijnen.

Na de Methacholine provocatie test

U mag na het onderzoek uw eigen medicijnen/pufjes weer gebruiken, tenzij anders is afgesproken met uw (long)arts.

Aanvullende informatie

Meer informatie over longfunctieonderzoeken vindt u:

- in de folder Spirometrie (Longfunctieonderzoek);
- in de folder Methacholineprovocatietest;
- op de website van MST onder het specialisme Longgeneeskunde bij informatie over onderzoeken:
<https://www.mst.nl/p/specialismen/longgeneeskunde/onderzoeken/>

Belangrijke contactgegevens

- Polikliniek Longgeneeskunde, route B23, telefoon (053) 487 26 10.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts, verpleegkundige of longfunctie analist dan om nadere uitleg.