

Toediening van cytostatica intratheaal

Toediening van cytostatica in het hersenvocht

Hematologie / Oncologie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de dagbehandeling voor een toediening van cytostatica intratheaal. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

Wat is een toediening van cytostatica intratheaal?

Cytostatica zijn medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Het medicijn/de medicijnen wordt/worden in het hersenvocht (intratheaal), toegediend ter voorkoming van ziekte in het hersenvocht. Cytostatica die via het infuus of via tabletten worden toegediend, kunnen ziekteactiviteit in het hersenvocht vaak niet voldoende bereiken.

Vorbereiding

Houd bij de voorbereiding op de toediening van cytostatica intratheaal rekening met het volgende:

- neem uw identiteitsbewijs mee;
- meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de Dagbehandeling, route E21;
- u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken;
- wij vragen u om een begeleider mee te nemen, die u na de ingreep naar huis kan brengen. Door de behandeling is zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer onverantwoord.

Behandeling

De behandeling vindt plaats door het inspuiten van cytostatica in het hersenvocht, via een ruggenprik, ook wel lumbaalpunctie genoemd. Deze handeling wordt door de neuroloog uitgevoerd.

De arts vraagt u om op de rand van het bed te gaan zitten met de voeten op een krukje, of op uw zij te gaan liggen in een zogenaamde foetushouding (met opgetrokken knieën). Het is dan de bedoeling dat u de rug zo bol mogelijk maakt, zodat de arts de naald goed tussen de ruggenwervels kan plaatsen. Wanneer de naald op zijn plaats zit, neemt de arts eerst wat druppels hersenvocht af om te onderzoeken. Vervolgens spuit de arts de cytostatica in en aansluitend, via dezelfde injectie (spuit), prednison. Prednison wordt gegeven om mogelijke bijwerkingen te verlichten.

Bijwerkingen

Bij deze behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- hoofdpijn;
- misselijkheid;
- braken;
- koorts;
- rugpijn;
- een stijve nek.

Na de behandeling

Het kan zijn dat u bij het opstaan na een lumbaalpunctie hoofdpijn krijgt. Daarom wordt u aangeraden nog 30 tot 60 minuten plat in bed te blijven liggen.

Controleafspraak

Een controle afspraak is niet nodig.



(Pijn)klachten

Heeft u problemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Dagbehandeling Interne Geneeskunde, tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer (053) 487 29 72. Bij acute problemen 's avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met het centrale nummer van MST, telefoon (053) 4 87 20 00, vraagt u naar de dienstdoende internist.

Belangrijke contactgegevens

- Dagbehandeling Interne Geneeskunde, route E21, telefoon (053) 4 87 29 72.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.