

Behandeling met immunotherapie en chemotherapie

PEMBROLIZUMAB / PEMETREXED onderhoudsbehandeling (1303)

Inleiding

U heeft een afspraak bij longgeneeskunde voor een chemo- en immunokuur. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

Deze kuur bestaat uit 1 soort immunotherapie en 1 soort chemotherapie. Het is een onderhoudsbehandeling welke gegeven wordt na 4 kuren chemotherapie met een platinumhoudende chemotherapie en eventueel radiotherapie. Daarnaast worden nog enkele andere medicijnen voorgeschreven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Behandeling

Deze kuur wordt gegeven met een interval van \pm 3 weken. Hier zijn uitzonderingen op. Dan wordt dit duidelijk aangegeven door uw behandelend specialist. Indien er geen toename van ziekte is en u de behandeling goed verdraagt, wordt de kuur maximaal twee jaar gegeven.

Dagopname

De kuur wordt gegeven op de dagbehandeling E21

Labcontrole

Voor iedere behandeling wordt bloed geprikt; hetzij een dag van tevoren of op de dag van een polibezoek aan uw longarts of verpleegkundig specialist. Het kan zijn dat de bloeduitslagen onvoldoende zijn voor een volgende kuur. Dan wordt een chemokuur uitgesteld. Dit gebeurt vaker en heeft geen nadelige gevolgen voor het effect van de behandeling.

Beeldvorming

Na de tweede kuur wordt een CT scan gemaakt. Het vervolg en de frequentie van de scans wordt door uw behandelend arts met u besproken.

Besmetting

Resten van de chemotherapie kunnen 4 dagen na de toediening vanaf dag 1 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, braaksel en transpiratie) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee kunt omgaan.

De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1 van de chemokuur, als de bloeduitslagen goed zijn.

Bijwerkingen

Bij deze kuur kunnen bijwerkingen optreden. Indien deze optreden kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige (casemanager).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus krijgen.
- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken.
- Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek heeft in eten.
- Diarree of obstipatie
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.

- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen.
- Belangrijk is een goede mondverzorging.
- Gehoorafwijkingen
- Huiduitslag
- Vocht vasthouden
- Uw haar kan gaan uitvallen; meestal begint dit tussen de eerste en tweede chemokuur.
- Deze kuur kan vermoeidheid veroorzaken; ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.

De casemanager geeft u uitleg over de behandeling en spreekt de belangrijkste bijwerkingen met u door en legt ook uit wat te doen bij eventuele bijwerkingen.

SCHEMA CHEMO- EN IMMUNOTHERAPIE EN INNAME MEDICATIE RONDOM DE CHEMOKUUR

CHEMO- EN IMMUNOTHERAPIE OP DE AFDELING

Immunotherapie	DAG 1	Wijze van toediening
Pembrolizumab	•	Infuus 30 minuten
Chemotherapie		
Pemetrexed	•	infuus 15 minuten

MEDICATIE RONDOM DE CHEMO- EN IMMUNOTHERAPIE

Medicatie	
Foliumzuur 0.5mg	Dagelijks 1 tablet <i>Starten op de dag VOOR de eerste kuur Tot 3 weken na laatste pemetrexed innemen</i>
Vitamine B12 1000 µg	1 x per 9 weken een spuit <i>Starten op de dag van de eerste kuur Tot 3 weken na laatste pemetrexed innemen</i>

MEDICATIE RONDOM DE CHEMO- EN IMMUNOTHERAPIE

Dag voor de kuur DAG 0	24 uur voor de kuur innemen
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten
Dag van de kuur DAG 1	1 uur voor de kuur innemen
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten

Dag van de kuur DAG 2	1 dag na de kuur innemen
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten

DAG 3 en volgende
Wanneer u nog misselijk bent: Metoclopramide 3 x daags 10 mg een half uur voor de maaltijd

Belangrijke telefoonnummers / contactgegevens

- Binnen kantooruren: Poli longgeneeskunde: 053-4872610
- Buiten kantooruren: Receptie MST: 053-4872000

Aanvullende informatie

- folder; Pembrolizumab
- op de website van de patiëntenvereniging <https://www.longkankernederland.nl>

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.