



Adviezen na gebitssanering

Kaakchirurgie, Bijzondere Tandheelkunde & Kindergeneeskunde

Inleiding

Voor je kind is een goed herstel belangrijk, lees deze folder daarom goed door en volg de adviezen goed op. De beschreven klachten komen niet altijd voor. Deze folder geeft algemene adviezen na gebitssanering.

Behandeling

Vóór de behandeling worden er eerst röntgenfoto's gemaakt. Met behulp van deze foto's wordt het behandelplan gemaakt: tanden en kiezen kunnen worden geseald (laklaagje), gerestaureerd (vulling), een roestvrij stalen kroon kan worden geplaatst, of worden verwijderd.

Eten en drinken

Geef de eerste 6 uur na de ingreep geen heel warm en of heel koud drinken aan je kind. Om de wonden te ontzien, kun je de eerste dagen na de ingreep beter geen hard voedsel geven.

Mondhygiëne

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag je de eerste 24 uur de mond van je kind niet spoelen. Probeer ook te voorkomen dat je kind met de vingers in de mond komt. Een schone wond geneest beter dan een vieze.

De volgende dag kun je de tanden en kiezen van je kind weer gaan poetsen met een zachte tandenborstel, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Napijn

Na de behandeling is het normaal dat je kind pijn heeft. Je kunt je kind rustig een paracetamol geven volgens afspraak. De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt.

Let op dat je kind niet gaat zuigen of bijten op de lip of wang als de verdoving nog niet is uitgewerkt; je zoon of dochter voelt dit niet en kan zo de lip of wang kapot maken.

Nabloeding

In geval van een nabloeding moet je kind gedurende 30 minuten de mond stevig dichtbijten op een dubbelgevouwen verbandgaas of een zakdoek. Bloedt het aan de zijkant, dan kun je een gaasje met je vinger er tegen aan drukken. Je mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het gestopt is. Stopt het bloeden niet, herhaal deze procedure dan. Helpt dit nog niet, neem dan contact op met de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde (na 16.30 uur met de Huisartsenpost Enschede).

Hechtingen

Meestal wordt er gehecht met materiaal dat na 2 tot 3 weken vanzelf oplost. Als dit niet het geval is, dan krijg je een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Naar huis

Als je kind goed drinkt en niet misselijk is, mag hij/zij weer naar huis.



Bij vragen, nabloeding of hoge temperatuur kun je tot 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde, telefoon (053) 487 27 10.

Buiten kantooruren neem je contact op met de Huisartsenpost te Enschede, telefoon (088) 555 11 88.

Belangrijke contactgegevens

- polikliniek Bijzondere Tandheelkunde, route A17, telefoonnummer (053) 487 27 10;
- Huisartsenpost Enschede, route via Beltstraat 70, telefoonnummer (088) 555 11 88;
- Kinder- en Tienerafdeling, route H31, telefoonnummer (053) 487 23 78.

Tenslotte

Je hebt recht op juiste en volledige informatie. Pas als je voldoende inzicht hebt, kun je weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek.

Als iets je niet geheel duidelijk is, vraag de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

Meer informatie over de rechten van ouders en kinderen en het geven van toestemming voor behandeling en / of onderzoek vindt u in het opnameboekje van de Kinder- en Tienerafdeling en op de website van ons ziekenhuis:

www.mst.nl/kindergeneeskunde