

Alpelisib en fulvestrant

Inleiding

U ontvangt deze patiëntinformatie omdat het medicijn alpelisib aan u is voorgeschreven. Alpelisib wordt gebruikt voor de behandeling van hormoongevoelige en HER2-negatieve borstkanker die gevorderd of uitgezaaid is.

Hoe werkt alpelisib

Alpelisib is een doelgerichte therapie. De werkzame stof alpelisib bindt aan de PI3K-eiwitten en remt de werking van PI3K-eiwitten, waardoor de tumorgroei geremd wordt. .

Hoe gebruikt u de alpelisib

Alpelisib is er in 3 sterktes. Normaal wordt er gestart met een dosering van 300 mg eenmaal per dag. Alpelisib moet direct na het eten ingenomen worden, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Alpelisib wordt dagelijks genomen.

Alpelisib wordt gecombineerd met fulvestrant (hormoon). Fulvestrant wordt in de spier geïnjecteerd (meestal de bilspier) en elke behandeling bestaat uit 2 injecties. Uw doktersassistente/huisarts geeft u de injecties. Fulvestrant wordt elke 4 weken toegediend. Alleen in de eerste behandelcyclus krijgt u een extra toediening na 2 weken.

Aandachtspunten voor het innemen van medicatie alpelisib

- Direct na een maaltijd innemen
- Neem de medicijnen elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip in met een glas water
- De tabletten heel innemen (dus niet kauwen of pletten)
- Als u het medicijn mist of uitbraakt, neem dan niet een dubbele dosis in, maar ga gewoon de volgende dag verder

Uw arts of verpleegkundig specialist zorgt steeds voor een nieuw recept van alpelisib. U kunt dit alleen bij de ziekenhuisapotheek (politheek) ophalen. De recepten voor uw hormoonbehandeling (fulvestrant) kunnen zowel bij de ziekenhuisapotheek als bij uw eigen apotheek worden opgehaald.

Menopauze

Als u nog niet in de menopauze (overgang) bent, ontvangt u ook een andere behandeling om de eierstokfunctie uit te schakelen. Dit zijn injecties die door uw huisarts/doktersassistente gegeven worden, afhankelijk van welk middel elke 4 of 12 weken.

Dosering vergeten?

- Duurt het nog meer dan 15 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt?
Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem de volgende dosis in op het moment dat u gewend bent.
- Duurt het nog minder dan 15 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Neem de volgende dosis in op het moment dat u gewend bent. Neem nooit een dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts welke andere medicijnen u gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit geldt ook voor supplementen en alternatieve middelen die niet voorgeschreven zijn door een arts. Er kunnen namelijk wisselwerkingen zijn tussen deze medicijnen en alpelisib. In het bijzonder geldt dit indien u antistollingsmedicijnen (bloedverdunners) gebruikt. Gebruik ook geen middelen die sint-janskruid bevatten.

Hoe te bewaren

Er zijn geen speciale instructies voor het bewaren van alpelisib, maar houd het middel buiten bereik van kinderen.

Gebruik geen alpelisib als u:

Overgevoelig (allergisch) bent voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen. Deze stoffen staan vermeld in de bijsluiter. Vertel uw behandelend arts als u denkt dat u allergisch bent voor één van deze stoffen.

BIJWERKINGEN

Hier volgt een opsomming van mogelijke bijwerkingen, deze hoeven uiteraard niet bij iedereen voor te komen.

- Hoge bloedsuiker 70%
- Afname van witte bloedcellen (verminderde afweer)
- Afname van rode bloedcellen en bloedplaatjes 50%
- Mondproblemen 30%
- Hoge bloeddruk
- Vocht vasthouden enkels/onderbenen
- Maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree 50%
- Huiduitslag 50%
- Haarverlies (dunner haar)
- Reactie op injectieplaats (alleen bij fulvestrant)
- Opvliegers
- Gewrichtspijn
- Stijging van leverwaarden in het bloed

Controle tijdens de behandeling

Eerste 2 weken wekelijks nuchter bloedprikken.

Dan na 4 weken en 6 weken.

Als deze goed blijven, kunnen daarna de controles naar 1x per 4 weken.

Op de dag vóór elke afspraak laat u bloedprikken bij prikpost van Unilabs. Zelf een afspraak maken voor het bloedprikken bij Unilabs: telefonisch of online (<https://unilabs.nl/afspraak-maken>). Indien de afspraak op maandag dan bloedprikken op de vrijdag ervoor.

Duur behandeling

De behandeling kan doorgaan zolang deze werkzaam is tegen de borstkanker en u de behandeling goed verdraagt. Dit wordt gecontroleerd in een gesprek, door bloedcontroles en zo nodig door scans. Eventueel kunnen de controles na een tijd ook elke 8 weken plaatsvinden.

Vertel uw arts of verpleegkundig specialist als u last heeft gehad van een bijwerking. Omdat lage witte bloedcellen vaak voorkomen bij deze behandeling, wordt uw bloed getest vooraf aan elke behandelcyclus (4 weken) en in het begin vaker. Als uw witte bloedcellen te laag zijn aan het begin van een nieuwe cyclus, kan uw behandelaar besluiten om de volgende cyclus uit te stellen en/of de dosering te verlagen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts/verpleegkundig specialist in geval van:

- Koorts
- Koude rillingen
- Kortademigheid
- Bloedingen
- Veel blauwe plekken

CONTACT

Tijdens kantoortijden (8:30-16.30u)

Verpleegkundig specialisten: Brigitte Heck en Elvera Meussen.

Interne geneeskunde, unit hematologie/oncologie

Telefoon: **053-4872440**

Buiten kantoortijden, alléén bij spoedvragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag

Medisch Spectrum Twente: **053-4872000**

Vragen naar de dienstdoende internist