

Behandeling met immunotherapie

Nivolumab + Carboplatine/Paclitaxel (1552)

Inleiding

U heeft een afspraak bij longgeneeskunde voor uitleg over chemo- en immunotherapie. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling. Deze kuur bestaat uit een soort immunotherapie en twee soorten chemotherapie.

Behandeling

Deze kuur wordt gegeven met een interval van drie weken. Hier zijn uitzonderingen op. Dan wordt dit duidelijk aangegeven door uw behandelend specialist.

Dagopname

De kuur wordt gegeven op de dagbehandeling E21

Labcontrole

Voor iedere behandeling wordt bloed geprikt; hetzij een dag van tevoren of op de dag van een polibezoek aan uw longarts of verpleegkundig specialist.

Beeldvorming

Na de derde behandeling wordt een CT scan gemaakt. Het vervolg en de frequentie van de scans wordt door uw behandelend arts met u besproken.

Besmetting

Resten van de chemotherapie kunnen 4 dagen na de toediening vanaf dag 1 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, braaksel en transpiratie) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee kunt omgaan.

De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1 van de chemokuur, als de bloeduitslagen goed zijn.

Bijwerkingen

Bij deze kuur kunnen bijwerkingen optreden. Indien deze optreden kunt u het beste contact kunt opnemen met uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige (casemanager).

De volgende bijwerkingen van de immunotherapie kunnen optreden:

- Vermoeidheid
- Misselijkheid
- Verminderde eetlust
- Huiduitslag
- Diarree

De volgende bijwerkingen van de chemotherapie kunnen optreden:

- Overgevoelighedsreacties veelal bij de eerste toediening; huiduitslag, benauwdheidsklachten, bloeddrukval; de verpleging is hier op voorbereid en weet hoe te handelen
- Huiduitslag 1 à 2 dagen na toediening blozend
- Spier-, gewrichtspijn; kan optreden op 2 à 3 dagen na toediening
- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus krijgen.
- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken.
- Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek heeft in eten.
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.

De casemanager geeft u uitleg over de behandeling en bijwerkingen en legt u uit wat te doen bij eventuele bijwerkingen.

SCHEMA IMMUNOTHERAPIE

IMMUNOTHERAPIE VIA INFUUS

Immunotherapie	Dag 1	Duur kuur
Nivolumab	•	Infuus 30 minuten

CHEMOTHERAPIE VIA INFUUS

Chemotherapie	Dag 1	Duur kuur
Paclitaxel	•	Infuus 3 uur
Carboplatine	•	Infuus 30 minuten

MEDICATIE RONDOM DE CHEMOKUUR

Dag van de kuur DAG 1	1 uur voor de kuur innemen
Granisetron 2 mg	1 x 1 tablet
Aprepitant 125 mg	1 x 1 tablet

Na de kuur DAG 2 en 3	
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten
Aprepitant 80 mg	1 x 1 tablet

DAG 4 en volgende
Wanneer u nog misselijk bent: Metoclopramide 3 x daags 10 mg een half uur voor de maaltijd

Belangrijke telefoonnummers / contactgegevens

- Binnen kantooruren: Poli longgeneeskunde: 053-4872610

- Buiten kantooruren: Receptie MST 053-4872000

Aanvullende informatie

- Folder; Nivolumab/ipilimumab
- Patiënt informatie map
- op de website van de patiëntenvereniging <https://www.longkankernederland.nl>

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.