



**Adviezen aan patiënten die met thiamazol (Strumazol) of propylthiouracil (PTU) behandeld worden**

U wordt behandeld met thiamazol of propylthiouracil omdat uw schildklier te snel werkt. Dit medicijn vertraagt zeer effectief de werking van de schildklier, maar kan een ernstige, maar gelukkig zeer zeldzame afwijking van het bloedbeeld geven, met name een tekort aan witte bloedcellen.

Deze bijwerking zien wij niet aankomen en daarom adviseren wij om bij alarmsignalen zoals keelpijn, longontsteking of koorts boven de 38.5 °C, direct uw huisarts of specialist te bellen. Diezelfde dag krijgt u een bloedonderzoek (tellen van de witte bloedcellen, leuco's en differentiatie).

Wanneer het aantal witte bloedcellen te laag is, moet de behandeling met thiamazol of propylthiouracil gestopt worden. Na stoppen van het medicijn treedt herstel van het bloedbeeld na enkele dagen op.

Neem bij verdere vragen contact op met uw huisarts of behandelend specialist via één van onderstaande telefoonnummers.

De vakgroep Endocrinologie:

Dr. R. Groote Veldman

Dr. M. van Haaren

Dr. M.J.M. Pouwels

G.D. Kant

Dr. M. Out