

**CAPECITABINE (gebruik indien patiënten niet kunnen slikken)**

**Inname tabletten:**

- Tabletten dienen in zijn geheel te worden ingenomen binnen 30 minuten na de maaltijd, met een tussenpoos van ca 12 uur.
- Indien patiënt braakt na inname tabletten, dienen deze **niet** nogmaals te worden ingenomen.
- Indien patiënt een dosis is vergeten, dienen deze **niet** alsnog te worden ingenomen, maar het normale doseringsschema dient te worden gehanteerd.

Indien een patiënt de tabletten niet in zijn geheel kan innemen mogen deze bij **hoge uitzondering** worden vergruisd.

**Hanteer de volgende werkwijze bij vergruizen:**

- Plaats een glas (of beker) met een klein volume (ongeveer 200ml) lauwwarm water op het aanrecht;
- Gebruik hiervoor een glas dat niet door anderen wordt gebruikt;
- Leg het voorgeschreven aantal capecitabine tabletten hierin;
- Druk de tabletten vervolgens met een lepel uit elkaar en los de tabletten op deze wijze op;
- Voeg wat suiker of zoete fruitsiroop toe om de bittere smaak van de tabletten te maskeren;
- Neem direct na bovenstaande handeling de volledige oplossing in;
- Spoel het glas goed na met (een beetje) water en neem de oplossing nogmaals in;
- Indien er op het aanrecht gemorst is, neem het aanrecht goed af met een (vochtig) doekje of tissue. Gooi het doekje of de tissue daarna weg op dusdanige wijze dat anderen hier niet mee in contact kunnen komen;
- Zorg ervoor het glas steeds goed wordt gereinigd door deze af te wassen met afwasmiddel;
- Was uw handen zorgvuldig.