

Lanreotide

Inleiding

U ontvangt deze patiëntinformatie omdat het medicijn lanreotide aan u is voorgeschreven. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van een neuro-endocriene tumor (NET)

Neuro-endocriene tumoren kunnen een overmaat aan hormonen en hormoonachtige stoffen produceren, zoals serotonine, tachykinine, neuropeptiden en insuline. In een gezond lichaam worden dit soort hormonen alleen door organen uit het neuro-endocriene systeem (bijvoorbeeld de schildklier of de alvleesklier) geproduceerd. De hormonen geven via het bloed zogenaamde signalen af en sturen andere organen aan. Ongeveer de helft van de verschillende neuro-endocriene tumoren produceert een te veel aan hormonen. Daardoor kunnen klachten optreden, bijvoorbeeld opvliegers (ook wel flushes genoemd), diarree, benauwdheid, misselijkheid, duizeligheid en buikpijn.

Hoe werkt lanreotide?

Lanreotide lijkt op het lichaamseigen hormoon somatostatine dat een remmende werking heeft op allerlei andere hormonen. Hormonen die juist bij een NET tumor teveel worden gemaakt. Lanreotide bindt zich aan neuro-endocriene tumorcellen. Door deze binding wordt de productie van de hormonen verminderd, waardoor klachten als diarree en opvliegers zullen afnemen.

Waarom deze behandeling?

Lanreotide kan uw klachten van overmatige hormoonproductie verminderen en heeft daarnaast een remmende werking op de groei van de neuro-endocriene tumor.

Hoe gebruikt u lanreotide?

Deze behandeling bestaat uit één medicijn. De behandeling wordt eenmaal per 4 weken gegeven door uw huisarts.

Dag	1	2 t/m 28	Wijze van toediening
Lanreotide	X	Rust	Subcutane injectie

Combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts welke andere medicijnen u gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit geldt ook voor supplementen en alternatieve middelen die niet voorgeschreven zijn door een arts. Er kunnen namelijk wisselwerkingen zijn tussen deze medicijnen en lanreotide.

Kunt u op vakantie?

Het is mogelijk de behandeling voort te zetten wanneer u op vakantie bent. Bespreek dit vooraf met uw huisarts of internist. Zorg dat u de telefoonnummers van de huisarts/ polikliniek/ziekenhuis bij de hand heeft.

Werken tijdens en na de behandeling

Aan het werk blijven of het werk weer oppakken kan ten goede komen aan uw welbevinden. Werken kan, naast inkomen, ook afleiding en houvast bieden. Indien uw ziekte, de bijwerkingen van de behandeling en het soort werkzaamheden het toelaten, raden wij u aan om (voor een deel) aan het werk te blijven. Voor algemene tips en adviezen kunt u bijvoorbeeld kijken op www.kanker.nl of www.kankerenwerk.nl. Daarnaast adviseren wij u contact op te nemen met uw bedrijfsarts.

Bijwerkingen

Maag-darmklachten: u kunt buikpijn krijgen.

Advies

- Paracetamol gebruiken 4x daags 1000 mg.

Misselijkheid en braken. Klachten die hiermee gepaard kunnen gaan:

- Verminderde eetlust
- Een vol gevoel
- Opboeren
- Zuurbranden

Advies:

- Gebruik regelmatig een kleine maaltijd
- Forceer het eten niet
- Wanneer u weinig drinkt kunt u meer last krijgen van een ziek en misselijk gevoel. Het is daarom belangrijk dat u voldoende drinkt: 1.5-2 liter per dag.

Pijn, zwelling, roodheid en ontsteking van de injectieplaats

Advies:

- Vóór het toedienen de injectievloeistof opwarmen tot kamertemperatuur
- Langzaam de vloeistof in laten lopen
- De injectieplaats 3 à 4 minuten afdrukken na het toedienen
- De injectieplaats afwisselen.

Verhoogde bloedsuikers

U kunt een verhoogd bloedsuikergehalte krijgen. Klachten die hiermee gepaard gaan zijn:

- Dorstgevoel
- Veel plassen
- Wazig zien
- Verminderd bewustzijn
- Jeuk
- Afvallen
- Slechte wondgenezing.

Indien u één of meerdere van deze klachten heeft bespreek dit dan met uw huisarts of met uw behandelend internist.

Galstenen

Door het gebruik van lanreotide kunnen galstenen ontstaan. In de meeste gevallen merkt u hier niets van en kunnen de galstenen in de galblaas blijven zitten. Als u echter plotse hevige pijn in de rechterbovenbuik krijgt met eventueel misselijkheid daarbij, dan kan dat wijzen op galsteenlijden. Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Overgevoeligheid/allergie

Lanreotide wordt door het lichaam als een lichaamsvreemde stof (antigeen) gezien en kan zodoende een allergische reactie veroorzaken. Een allergische reactie begint vaak met:

- Roodheid en huiduitslag, soms met jeuk over het hele lichaam
- Verwijding van de bloedvaten

Later kunnen de volgende verschijnselen optreden:

- Bleekheid
- Gezwollen oogleden en een opgezet gezicht
- Beklemmend gevoel op de borst
- Duizeligheid en bloeddrukdaling
- Rillen
- Misselijkheid en darmkrampen

- Kortademigheid
- Gevoel van onrust.

Een allergische reactie treedt meestal op tijdens de toediening. De klachten verdwijnen na behandeling snel.

Wanneer u zich tijdens of direct na toediening anders voelt dan normaal, meld dit dan onmiddellijk aan uw huisarts of aan de internist

Neem onmiddellijk contact op met uw arts in geval van:

- Koorts ($>38,5^{\circ}\text{C}$)
- Koude rillingen
- Kortademigheid

CONTACT

Bespreek vragen en klachten tijdens het geplande gesprek met de arts

Indien uw vraag of klacht niet kan wachten tot het volgende gesprek, belt u tijdens kantoortijden (8.30-16.30 uur)

Telefoon: 053-4872440

Buiten kantoortijden belt u alléén bij spoedvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag

Medisch Spectrum Twente: 053-4872000

Vragen naar de dienstdoende internist.