

Vorbereitung bij een contrastallergie (Folder CT-10)

Medische Beeldvorming

Inleiding

U ondergaat binnenkort een onderzoek waarbij röntgencontrastvloeistof wordt gebruikt. Uitgebreide informatie over dit onderzoek heeft u eerder in de onderzoeksfolder kunnen lezen. U heeft aangegeven dat u (mogelijk) overgevoelig bent voor contrastvloeistof. Daarom krijgt u een extra voorbereiding op het onderzoek. Deze extra voorbereiding voorkomt of vermindert een eventuele overgevoeligheidsreactie.

Deze folder geeft algemene informatie over deze voorbereiding. Het is zeer belangrijk dat u deze folder goed doorleest van de voorbereiding tot het onderzoek. Het is zeer belangrijk dat u deze folder goed doorleest van de voorbereiding tot het onderzoek.

Vorbereitung

Houd bij de voorbereiding van het onderzoek rekening met het volgende:

- U ontvangt naast een afspraak bevestiging deze folder. Uw arts schrijft een recept uit voor 1 tablet 30 mg Predisolon. Deze tablet kunt u ophalen bij uw eigen apotheek".
- neemt u deze tablet 24 uur voor het onderzoek in;
- neemt u een begeleider mee die u na het onderzoek naar huis kan brengen. Tijdens het onderzoek krijgt u Tavegil. Dit medicijn kan uw reactievermogen beïnvloeden. **U mag daarom de eerste 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.**

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Via het infuus wordt eerst een medicijn toegediend: Tavegil. Dit is een antihistaminicum, het beperkt de kans op een reactie tot een minimum. Vervolgens wordt via hetzelfde infuus het röntgencontrastmiddel toegediend. Het infuus zal tot het einde van het onderzoek blijven zitten.

Antihistaminica zijn, letterlijk vertaald, medicijnen tegen histamine. Histamine is een stof die normaal in het lichaam voorkomt en die een rol speelt bij de afweer. Bij sommige mensen komt er te veel histamine vrij als ze in aanraking komen met bepaalde stoffen, zoals (in dit geval) röntgencontrastvloeistof. Daardoor ontstaat er een overgevoeligheidsreactie. Antihistaminica blokkeren de werking van histamine, waardoor u minder last hebt van de overgevoeligheidsreactie.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de afdeling medische beeldvorming en onze onderzoeken vindt u op de website www.mst.nl/p/specialismen/radiologie/.

Belangrijke contactgegevens

Medische Beeldvorming, route D15, (053) 4 87 32 00.

Toestemming of bezwaar maken voor het delen van medische gegevens

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden is het van belang dat zorgaanbieders gegevens met elkaar kunnen delen. Dit delen kan en mag alleen als je daar zelf toestemming voor geeft. Dit kunt u zelf regelen in MijnMST, of aangeven bij het secretariaat van uw specialist.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u behandelend arts, verpleegkundige of medewerker Medische Beeldvorming dan om nadere uitleg.